

قرص های ترکیبی ال دی تری فازیک

الف - بررسی سطح اول - موارد منع مصرف مطلق و نسبی:

سابقه سکتة قلبی یا مغزی، لخته خون در پاها یا ریه	بلی	خیر	شک به سرطان پستان، ابتلا یا سابقه آن	بلی	خیر	داشتن فشارخون بیش از ۱۶۰/۱۰۰ میلی متر جیوه	بلی	خیر
خونریزی رحمی بدون علت مشخص	بلی	خیر	ابتلای به دیابت به مدت بیست سال یا بیش از آن	بلی	خیر	زایمان در سه هفته گذشته در زن غیر شیرده	بلی	خیر
سیگاری ۳۵ ساله یا مسن تر	بلی	خیر	سر درد های مکرر شامل میگرن با علایم عصبی موضعی	بلی	خیر	بیماری فعال یا مزمن کبدی	بلی	خیر
کارسینوم اندومتر	بلی	خیر	فشارخون کنترل شده ۱۴۰/۹۰ تا ۱۶۰/۱۰۰ میلی متر جیوه	بلی	خیر	سیگاری زیر ۳۵ سال	بلی	خیر
مادران شیرده با شیرخوار کوچک تر از ۶ ماه	بلی	خیر	مصرف داروی صرع (جز والپروئیک اسید)، ریفامپین یا گریزوفولونین	بلی	خیر	سابقه زردی انسدادی دوران حاملگی	بلی	خیر

ب - بررسی سطح دوم - موارد منع مصرف نسبی و مطلق:

سر درد های مکرر شامل میگرن با علایم عصبی موضعی	بلی	خیر	سکتة قلبی، مغزی یا بیماری شدید قلبی یا عروقی	بلی	خیر	هر بدخیمی مشکوک یا شناخته شده وابسته به استروژن	بلی	خیر
بیماری فعال یا مزمن کبدی، یا همزمان با مصرف قرص و اختلال چربی ها	بلی	خیر	شرایط نیازمندی حرکتی کامل (۲۸ روز قبل از عمل تا پایان بی حرکتی پس از عمل)	بلی	خیر	ابتلا فعلی یا سابقه لخته خون در ورید های عمقی، اختلالات ترومبومبولیک یا شرایط مستعد کننده این بیماری ها	بلی	خیر
افزایش چربی های خون	بلی	خیر	دیابت با بیماری های عروقی	بلی	خیر	بیماری سیانوتیک قلب	بلی	خیر
بیماری های دریچه ای قلب با عوارض	بلی	خیر	میگرن بدون علامت موضعی و سن بیش از ۳۵	بلی	خیر	سابقه هر بیماری مرتبط با مصرف قرص	بلی	خیر
بیماری های عروق کرونر، آئزین قلبی یا شرایط مستعد کننده آنها	بلی	خیر	بیماری عروق مغزی، سابقه این بیماری ها یا شرایط مستعد کننده آن ها	بلی	خیر	وجود سایر موارد بیماری یا مشکل	بلی	خیر
ابتلا به بیماری های التهابی روده (کرون، کولیت زخمی، بیماری فعال کیسه صفر...)	بلی	خیر	بیماری دریچه ای بدون عارضه قلب	بلی	خیر	بدخیمی داخل اپیتلیومی تا شدید گردن رحم	بلی	خیر
توده پستانی تشخیص داده نشده	بلی	خیر	میگرن بدون علایم عصبی	بلی	خیر	افسردگی خیلی شدید	بلی	خیر
ترومبوفلیت سطحی	بلی	خیر	دیابت بدون درگیری عروقی	بلی	خیر		بلی	خیر

پ - زمان شروع مصرف قرص (بهورز - کاردان):

پنج روز اول قاعدگی و ترجیحا روز اول	پنج روز اول سقط و ترجیحا روز اول	سه هفته پس از زایمان در زن غیر شیرده
شش هفته پس از زایمان در زن شیرده	سایر زمان ها:	

ت - معاینه های لازم و نتایج آنها و تاریخ دریافت اولین بسته قرص (سطح اول):

تاریخ:

بررسی زردی پوست و چشم	نتیجه:	معاینه پستان	نتیجه:	وزن	کیلوگرم	قد	متر
فشارخون	نتیجه:	BMI	نتیجه:	تاریخ دریافت:			

ث - بررسی ها و آزمایش های بعدی:

بررسی دوره ای معاینه های قرص های ترکیبی									
زمان	سه ماه	شش ماه	۱۲ ماه	۱۸ ماه	۲۴ ماه	۳۶ ماه	۴۸ ماه	۶۰ ماه	۷۲ ماه
تاریخ									
فشار خون									
وزن									
تری گلیسرید									
قند									
چربی و لیپو پروتیین									

ج - ارزیابی خدمت، رضایت گیرنده خدمت و عارضه احتمالی (با "د" به جای "دارد" یا "ن" به جای "ندارد" کامل شود) - سطح اول:

مشکل / نوبت مراجعه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
تاریخ													
رضایت از روش													
تھوع													
سردرد خفیف													
حساسیت پستان ها													
لکه بینی یا خونریزی بین قاعدگی ها													
افزایش وزن													
درد شدید در قسمت بالای شکم													
درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرفه با خلط خونی													
تورم یا درد شدید یک پا													
مشکلات چشمی													
سردرد غیر معمول													
آموزش های لازم													

چ - علل و زمان قطع استفاده از روش (خانه های مربوطه را کامل کنید):

ترس از عارضه	عوارض	در صورت بروز عارضه، نوع عارضه:
مخالفت همسر	علت های دیگر:	
تاریخ قطع روش:	مدت استفاده از روش (ماه):	هنگام قاعدگی
		به جز هنگام قاعدگی

ح - آیا مراجعه کننده تمایل به استفاده از روش دیگری دارد؟ بلی خیر در صورت بلی بودن پاسخ این سوال، برای او چه کاری انجام شده است؟